

MAKLUMAT PENTING

UNTUK
PESAKIT

Hubungi doktor anda **DENGAN SEGERA** atau dapatkan rawatan kecemasan jika anda mempunyai **mana-mana gejala ini**:

Gejala Sindrom Pelepasan Sitokin (CRS)

- Demam (38°C atau lebih tinggi)
- Tekanan darah rendah
- Sesak nafas, kekeliruan, kegelisahan, masalah pernafasan
- Denyutan jantung laju atau tidak teratur: berdebar-debar, pening kepala
- Sakit kepala
- Mengigil
- Loya
- Muntah

Gejala masalah Neurologi

- Kesukaran bercakap, hilang ingatan, perubahan personaliti (ensefalopati)
- Kekeliruan
- Rasa bingung atau sukar berfikir dengan jelas (delirium)
- Sawan
- Hilang imbalan atau koordinasi (ataksia)
- Lemah atau kebas pada tangan dan kaki
- Tangan atau anggota badan mengeletar (tremor)
- Sakit kepala

Ini bukanlah semua kesan sampingan yang mungkin anda alami sepanjang penggunaan IMDELLTRA. Sekiranya anda mengalami sebarang kesan sampingan yang tidak dinyatakan di sini, sila maklumkan kepada penyedia penjagaan kesihatan anda.



Sila maklumkan kepada penyedia penjagaan kesihatan anda mengenai semua ubat yang sedang anda gunakan, termasuk ubat-ubatan, vitamin, mineral, suplemen semula jadi, atau ubat alternatif.

AMGEN

Amgen Biotechnology Singapore Pte Ltd
3 Fraser Street, #15-26/27, DUO Tower, Singapore 189352

IMPORTANT INFORMATION

FOR
PATIENTS

Contact your doctor **IMMEDIATELY** or seek emergency care if you have **any of these symptoms**:

Symptoms of Cytokine Release Syndrome (CRS)

- Fever (38°C or higher)
- Low blood pressure
- Shortness of breath, confusion, restlessness, trouble breathing
- Fast or irregular heartbeat: palpitations, dizziness
- Headache
- Chills
- Nausea
- Vomiting

Symptoms of Neurologic problems

- Trouble speaking, memory loss, personality changes (encephalopathy)
- Confusion
- Feeling disorientated or having difficulty thinking clearly (delirium)
- Seizure
- Loss of balance or coordination (ataxia)
- Weakness or numbness of arms and legs
- Shakiness of your hands or limbs (tremor)
- Headache

These are not all of the possible side effects you may have when taking IMDELLTRA. If you experience any side effects not listed here, tell your healthcare provider.



Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including any drugs, vitamins, minerals, natural supplements or alternative medicines.

AMGEN

Amgen Biotechnology Singapore Pte Ltd
3 Fraser Street, #15-26/27, DUO Tower, Singapore 189352

患者须知

的重要信息

如果您出现以下**任何症状**,请**立即**联系您的医生或寻求紧急医疗护理:

细胞因子释放综合征 (Cytokine Release Syndrome, CRS) 的症状

- 发烧 (38°C 或更高)
- 低血压
- 呼吸急促、意识混乱、烦躁不安、呼吸困难
- 心跳加快或心律不齐: 心悸、头晕
- 头痛
- 发冷
- 恶心
- 呕吐

神经系统问题的症状

- 说话困难、记忆力丧失、性格改变 (脑病)
- 意识混乱
- 感觉迷失方向或难以清晰思考 (谵妄)
- 癫痫
- 失去平衡或协调能力 (运动失调)
- 四肢无力或麻痹
- 手或四肢颤抖 (震颤)
- 头痛

以上项目并未涵盖您在服用IMDELLTRA期间可能出现的全部潜在副作用。如果您出现任何此处未列出的副作用,请告知您的医护人员。



请告知医护人员您服用的所有药物,包括任何药物、维生素、矿物质、天然补充剂或替代药物。

AMGEN

Amgen Biotechnology Singapore Pte Ltd
3 Fraser Street, #15-26/27, DUO Tower, Singapore 189352



重要提醒

您的医疗提供者将在 IMDELLTRA 输注开始后的第 1 周第 1 天和第 1 周第 8 天, 在适当的医疗环境中对您展开 22 至 24 小时的监察。此外, 在 IMDELLTRA 输注开始后的第 1 周第 1 天和第 1 周第 8 天, 您应在照顾者的陪同下, 在距离适当的医疗场所不超过 1 小时路程的地点再逗留 48 小时。



如果出现此卡所列症状, 请联系您的医生。
如果无法联系到医生, 请立即寻求紧急医疗护理。

给医护人员的重要资讯和联系方式

IMDELLTRA (TARLATAMAB) 患者提醒卡

请时刻随身携带此卡。
请向您提供护理的任何医护人员出示此卡。

版本 1.0
本文件 (英文版) 已于 2025 年 8 月 1 日 获得卫生科学局批准

Amgen Biotechnology Singapore Pte Ltd
3 Fraser Street, #15-26/27, DUO Tower,
Singapore 189352

AMGEN
SGP-757-1025-80009
Singapore 189352



IMPORTANT TO REMEMBER

Your healthcare provider will monitor you for 22 to 24 hours from the start of the IMDELLTRA infusion on Cycle 1 Day 1 and Cycle 1 Day 8 in an appropriate healthcare setting. Additionally, you should remain within 1-hour of an appropriate healthcare setting for a total of 48 hours after the start of the IMDELLTRA infusion on Cycle 1 Day 1 and Cycle 1 Day 8, accompanied by a caregiver.



CONTACT your doctor if you experience any of the symptoms present in this card.
SEEK emergency care if your doctor is not available.

IMPORTANT INFORMATION & CONTACT FOR HEALTHCARE PROVIDERS

IMDELLTRA (TARLATAMAB) PATIENT ALERT CARD

KEEP this card with you at all times.
SHOW THIS CARD to any healthcare providers involved in your care.

Version 1.0
This document has been approved by
HSA as of 01-Aug-2025

Amgen Biotechnology Singapore Pte Ltd
3 Fraser Street, #15-26/27, DUO Tower,
Singapore 189352

AMGEN
SGP-757-1025-80009
Singapore 189352



PERINGATAN PENTING

Penyedia penjagaan kesihatan anda akan memantau keadaan anda selama 22 hingga 24 jam bermula dari permulaan infusi IMDELLTRA pada Kitaran 1 Hari 1 dan Kitaran 1 Hari 8 dalam persekitaran penjagaan kesihatan yang sesuai. Selain itu, anda harus berada dalam lingkungan jarak 1 jam dari kawasan kemudahan penjagaan kesihatan yang sesuai sepanjang tempoh 48 jam selepas permulaan infusi IMDELLTRA pada Kitaran 1 Hari 1 dan Kitaran 1 Hari 8 serta ditemani oleh penjaga.



HUBUNGI doktor anda jika anda mengalami sebarang gejala yang dinyatakan dalam kad ini.
DAPATKAN rawatan kecemasan jika doktor anda tidak tersedia.

MAKLUMAT PENTING & MAKLUMAT KONTAK UNTUK PENYEDIA KESIHATAN

KAD PERINGATAN PESAKIT IMDELLTRA (TARLATAMAB)

SENTIASA SIMPAN kad ini bersama anda.
TUNJUKKAN KAD INI kepada mana-mana ahli profesional penjagaan kesihatan yang terlibat dalam penjagaan anda.

Versi 1.0
Dokumen ini (versi Inggeris) telah
diluluskan oleh HSA pada 01-Ogos-2025

Amgen Biotechnology Singapore Pte Ltd
3 Fraser Street, #15-26/27, DUO Tower,
Singapore 189352

AMGEN
SGP-757-1025-80009
Singapore 189352

- Pesakit ini telah menerima imunoterapi molekul Bispecific T-cell Engager (BiTE®) yang dipanggil IMDELLTRA (tarlatamab).
- IMDELLTRA ditindiskan untuk kanser paru-paru sel kecil.
- IMDELLTRA berpotensi menyebabkan kesan sampingan yang serius atau mengancam nyawa termasuk sindrom pelapasan sitokin (CRS) dan sindrom neurotoksisiti yang berkaitan dengan sel efektor imun (ICANS).
- Untuk maklumat lanjut mengenai IMDELLTRA serta tatacara pengurusan CRS dan ICANS dengan penggunaan IMDELLTRA, sila merujuk kepada Sisipan Bungkus IMDELLTRA.

NAMA PESAKIT:	
NAMA DOKTOR:	
NOMBOR TELEFON PEJABAT:	
NAMA HOSPITAL/KLINIK:	
TARIKH DAN MASA INFUSI IMDELLTRA:	
INFUSI PERTAMA (HARI 1)	
INFUSI KEDUA (HARI 8)	

Maklumat ini disediakan oleh Amgen sebagai sebahagian daripada pelan pengurangan risiko untuk IMDELLTRA dan tidak bertujuan untuk promosi.

This material was developed by Amgen as part of the risk minimisation plan for IMDELLTRA and is not intended for promotional use.

PATIENT NAME:	
DOCTOR NAME:	
OFFICE PHONE:	
AFTER HOURS PHONE:	
HOSPITAL/CLINIC NAME:	
DATE AND TIME OF IMDELLTRA INFUSION:	
1 st INFUSION (DAY 1)	
2 nd INFUSION (DAY 8)	

- This patient has received an immunotherapy Bispecific T-cell Engager (BiTE®) molecule called IMDELLTRA (tarlatamab).
- IMDELLTRA is indicated for small cell lung cancer.
- IMDELLTRA may cause side effects which may be severe and life-threatening such as cytokine release syndrome (CRS) and immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS).
- For further information on IMDELLTRA and the management of CRS and ICANS with IMDELLTRA, please consult the IMDELLTRA Singapore Package Insert.