

**I am under anticoagulation treatment
with Xarelto® (rivaroxaban).**

Name

Address

Date of birth

Weight

Other medications conditions

**In case of emergency,
please notify:**

Doctor's name

Doctor's phone

Please also notify:

Name

Phone

Relationship

Patient Alert Card

Xarelto® 2.5 mg

Xarelto® 10 mg

Xarelto® 15 mg

Xarelto® 20 mg



Tick the prescribed dose

- ◆ **Keep this card with you at all times**
- ◆ **Present this card to every physician or dentist prior to treatment**



Information for health care providers:

INR values should not be used as they are not a dependable measure of the anticoagulant activity of Xarelto®

What Should I Know About Xarelto®?

- ◆ Xarelto® thins the blood, which prevents you from getting dangerous blood clots
- ◆ Xarelto® must be taken exactly as prescribed by your doctor. To ensure optimal protection from blood clots, **never skip a dose**
- ◆ You must not stop taking Xarelto® without first talking to your doctor as your risk of blood clots may increase
- ◆ Tell your healthcare provider about any other medicines you are currently taking, took recently or intend to start taking, before you start Xarelto®
- ◆ Tell your healthcare provider that you are taking Xarelto® before any surgery or invasive procedure

When Should I Seek Advice From My Healthcare Provider?

- ◆ When taking a blood thinner such as Xarelto® it is important to be aware of its possible side effects.
- ◆ Bleeding is the most common side effect. Do not start taking Xarelto® if you know you are at risk of bleeding, without first discussing this with your doctor.
- ◆ Tell your healthcare provider straight away if you have any signs or symptoms of bleeding such as the following:
 - ◆ Pain
 - ◆ Swelling or discomfort
 - ◆ Headache, dizziness or weakness
 - ◆ Unusual bruising, nosebleeds, bleeding of gums, cuts that take a long time to stop bleeding
 - ◆ Menstrual flow or vaginal bleeding that is heavier than normal
 - ◆ Blood in your urine which may be pink or brown, red or black stools
 - ◆ Coughing up blood, or vomiting blood or material that looks like coffee grounds

How Do I Take Xarelto®?

- ◆ To ensure optimal protection, Xarelto®
 - 2.5 mg can be taken with or without food
 - 10 mg can be taken with or without food
 - 15 mg must be taken with food
 - 20 mg must be taken with food

关于 Xarelto® 我应该知道些什么?

- ◆ Xarelto® 稀释血液以防止发生危险性的血栓
- ◆ Xarelto® 必须严格按照医生的处方服用。为了最大程度预防血栓，**切勿漏服剂量**
- ◆ 未事先经医生同意，切勿停止服用 Xarelto®，因为形成血栓的风险可能会增加
- ◆ 在开始服用 Xarelto® 之前，请告知医护人员您正在服用、最近服用或打算开始服用的任何其他药物
- ◆ 在进行任何手术或侵入性操作之前，请告知医护人员您正在服用 Xarelto®

我应该在什么时候向医护人员寻求建议?

- ◆ 服用血液稀释剂如 Xarelto® 时，了解其可能的药物副作用非常重要
- ◆ 出血是最常见的副作用。如果您知道自己有出血风险，在没有事先与医生讨论的情况下，切勿开始服用 Xarelto®
- ◆ 如果您出现任何如下出血体征或症状，请立即告知医护人员：
 - ◆ 疼痛
 - ◆ 肿胀或不适
 - ◆ 头痛，晕眩或虚弱
 - ◆ 不寻常的瘀青、鼻出血、牙龈出血、伤口止血时间长
 - ◆ 流量比往常多的月经或阴道出血
 - ◆ 粉红色或褐色的尿液，红色或黑色的粪便
 - ◆ 咳嗽带血，呕血或呕出类似咖啡渣的物质

我该怎么服用 Xarelto®?

- ◆ 为了达到最理想的保护效果，Xarelto®
 - 2.5 mg 的剂量可在用餐前或用餐后服用
 - 10 mg 的剂量可在用餐前或用餐后服用
 - 15 mg 的剂量必须在用餐后服用
 - 20 mg 的剂量必须在用餐后服用

Maklumat Yang Perlu Saya Tahu Tentang Xarelto®

- ◆ Xarelto® ialah ubat cair darah yang boleh mencegah darah beku yang berbahaya.
- ◆ Xarelto® mesti diambil seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Untuk memastikan perlindungan optimum daripada darah beku, jangan tinggalkan dos yang perlu diambil.
- ◆ Jangan hentikan pengambilan Xarelto® tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu kerana risiko darah beku berlaku boleh meningkat.
- ◆ Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda tentang sebarang ubat yang sedang anda ambil, ubat yang diambil baru-baru ini atau ubat yang anda berhasrat untuk mula ambil, sebelum anda mulakan pengambilan Xarelto®
- ◆ Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda bahawa anda mengambil Xarelto® sebelum pembedahan atau prosedur invasif.

Bilakah Saya Harus Dapatkan Nasihat Daripada Penyedia Penjagaan Kesihatan Saya?

- ◆ Apabila mengambil ubat cair darah seperti Xarelto®, kesedaran tentang kesan sampingan ubat tersebut adalah amat penting
- ◆ Pendarahan ialah kesan sampingan yang paling biasa. Jangan mula mengambil Xarelto® jika anda tahu anda berisiko mengalami pendarahan tanpa berbincang dengan doktor terlebih dahulu.
- ◆ Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda dengan segera jika anda mengalami tanda atau gejala pendarahan seperti berikut:
 - ◆ Sakit
 - ◆ Bengkak atau rasa tidak selesa
 - ◆ Sakit kepala, pening atau rasa lemah
 - ◆ Lebam, hidung atau gusi berdarah yang tidak normal, pendarahan daripada luka yang mengambil masa yang lama untuk berhenti.
 - ◆ Haid atau pendarahan faraj yang lebih banyak daripada biasa.
 - ◆ Air kencing berdarah yang boleh berwarna merah jambu atau coklat. Najis berwarna merah atau hitam.
 - ◆ Batuk darah, muntah darah atau muntah serupa hampas kopi.

Bagaimanakah Saya Harus Mengambil Xarelto®?

- ◆ Untuk memastikan perlindungan optimum, Xarelto®:
 - 2.5 mg boleh diambil dengan atau tanpa makanan
 - 10 mg boleh diambil dengan atau tanpa makanan
 - 15 mg mesti diambil dengan makanan
 - 20 mg mesti diambil dengan makanan