

The patient who is under anticoagulation treatment with Xarelto® (rivaroxaban).

Name

Address

Birth date

Weight

Other medicines/conditions

In case of emergency,
please notify:

Doctor's name

Doctor's phone

Doctor's stamp

Please also notify:

Name

Phone

Relationship

Patient Alert Card



**Xarelto® (rivaroxaban)
1 mg/mL granules for
oral suspension**

Information to caregivers/patients:

- ◆ Keep this card with you at all times
- ◆ Present this card to every physician or dentist prior to treatment of the patient.



Information for healthcare providers:

INR values should not be used as they are not a dependable measure of the anticoagulant activity of Xarelto®

What should I know about Xarelto®?

- ♦ Xarelto® thins the blood, which prevents from getting dangerous blood clots.
- ♦ Xarelto® must be taken exactly as prescribed by the doctor. To ensure optimal protection from blood clots, **never skip a dose**.
- ♦ You must not stop giving/taking Xarelto® without first talking to the doctor, as the risk of blood clots may increase.
- ♦ Tell the healthcare provider about any other medicines the child is/you are currently taking, took recently or intend to start taking, before starting Xarelto®.
- ♦ Tell the healthcare provider that the child is/you are taking Xarelto® before any surgery or invasive procedure.

When should I seek advice from a healthcare provider?

- ♦ When taking a blood thinner such as Xarelto®, it is important to be aware of its possible side effects. Bleeding is the most common side effect. Do not start giving Xarelto® to the child/taking Xarelto® if you know the child is/you are at risk of bleeding, without first discussing this with the doctor.
- ♦ Tell the healthcare provider straight away if the child has/you have any signs or symptoms of bleeding, such as the following:
 - ♦ Pain
 - ♦ Swelling or discomfort
 - ♦ Headache, dizziness or weakness
 - ♦ Unusual bruising, nosebleeds, bleeding of gums, cuts that take a long time to stop bleeding give
 - ♦ Menstrual flow or vaginal bleeding that is heavier than normal
 - ♦ Blood in the urine which may be pink or brown; red or black stools
 - ♦ Coughing up blood, or vomiting blood or material that looks like coffee grounds

How do I give Xarelto® to the child?

How do I take Xarelto®?

- ♦ To ensure optimal protection, Xarelto® 1 mg/mL must be given/taken with feeding (breast milk or formula feeding) or with a meal.
- ♦ It can be administered through a nasogastric or gastric feeding tube.

Xarelto® – 我应该知道些什么？

- ♦ Xarelto®稀释血液以防止发生危险性的血栓。
- ♦ Xarelto®必须严格按照医生的指示服用。为了最佳提防血栓，切勿漏服。
- ♦ 在未经医生的同意前，切勿停止服用Xarelto®，因为形成血栓的风险可能会增加。
- ♦ 开始使用Xarelto®之前，请告诉医护人员孩子/您目前正在服用、最近服用、或打算开始服用的任何其他药物。
- ♦ 在进行任何手术或侵入性的操作之前，请通知医护人员孩子/您在服用Xarelto®。

我应该在什么时候向医护人员寻求建议？

- ♦ 服用血液稀释剂如Xarelto®时，务必了解因药物而可能会导致的副作用。流血是最常见的副作用。若您知道孩子/您有流血的风险，请勿在未和医生讨论之前开始服用Xarelto®。
- ♦ 如果孩子/您有任何如以下流血的迹象或症状，请马上告知孩子/您的医护人员：
 - ♦ 疼痛
 - ♦ 肿胀或不适
 - ♦ 头痛晕眩或虚弱
 - ♦ 不寻常的淤血、流鼻血、牙龈流血、伤口流血不止
 - ♦ 流量比往常多的月经或阴道流血
 - ♦ 粉红色或褐色的尿液，红色或黑色的粪便
 - ♦ 咳嗽带血，吐血或吐出类似咖啡渣的物质

我如何给予孩子Xarelto®？

我如何服用Xarelto®？

- ♦ 为达到最理想的效果，Xarelto® 1mg/mL 必须随喂食(母乳或配方奶)或随餐给予/服用。
- ♦ 可通过鼻胃管或胃饲管给药。

Maklumat yang perlu saya tahu tentang Xarelto®

- ♦ Xarelto® ialah ubat cair darah yang boleh mencegah darah beku yang berbahaya.
- ♦ Xarelto® mesti diambil dengan tepat seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Untuk memastikan perlindungan optimum daripada darah beku, **jangan sekali-kali melangkau dos**.
- ♦ Jangan berhenti daripada memberikan/mengambil Xarelto® tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu kerana risiko darah beku berlaku boleh meningkat.
- ♦ Beritahu penyedia penjagaan kesihatan anda tentang ubat yang sedang anak/anda ambil, ubat yang diambil oleh anak/anda baru-baru ini atau ubat yang anak/anda bercadang untuk ambil, sebelum mula mengambil Xarelto®.
- ♦ Beritahu penyedia penjagaan kesihatan bahawa anak/anda mengambil Xarelto® sebelum pembedahan atau prosedur invasif.

Bilakah harus saya dapatkan nasihat daripada penyedia penjagaan kesihatan?

- ♦ Apabila mengambil ubat cair darah seperti Xarelto®, kesedaran tentang kesan sampingan ubat tersebut adalah amat penting.
- ♦ Pendarahan ialah kesan sampingan yang paling biasa. Jangan mula memberikan Xarelto® kepada anak/mengambil Xarelto® jika anda mengetahui bahawa anak/anda berisiko mengalami pendarahan, tanpa berbincang dengan doktor terlebih dahulu.
- ♦ Beritahu penyedia penjagaan kesihatan dengan segera jika anak/anda mengalami tanda atau gejala pendarahan seperti berikut:
 - ♦ Kesakitan
 - ♦ Bengkak atau rasa tidak selesa
 - ♦ Sakit kepala, pening atau rasa lemah
 - ♦ Lebam, hidung berdarah, gusi berdarah yang tidak normal, pendarahan daripada luka yang mengambil masa yang lama untuk berhenti.
 - ♦ Haid atau pendarahan faraj yang lebih banyak daripada biasa.
 - ♦ Air kencing berdarah yang boleh berwarna merah jambu atau coklat. Najais berwarna merah atau hitam.
 - ♦ Batuk darah, muntah darah atau muntah serupa serbuk kopi.

Bagaimakah saya boleh memberikan Xarelto® kepada anak?

Bagaimakah saya boleh mengambil Xarelto®?

- ♦ Untuk memastikan perlindungan optimum, Xarelto® 1 mg/mL mesti diberikan/ambil dengan penyusuan (susu ibu atau susu formula) atau dengan makanan.
- ♦ Xarelto® boleh diberikan melalui tiub penyupan nasogaster atau gastostomi.